

Actions hors les murs



DEPISTAGE VIH/SIDA

HIV TESTING ATTITUDE
FREE & ANONYMOUS
HIV

Lundi/Monday 26/11/2012
 • 9H-13H DISPENSAIRE DE QUARTIER D'ORLEANS / HEALTH CENTER FRENCH QUARTER
 • 14H-18H YOUTH RADIO CONCORDIA

Mardi/ Tuesday 27/11/2012
 • 9H-13H DISPENSAIRE / HEALTH CENTER SANDY GROUND
 • 14H-18H PLACE DU MARCHÉ/MARKET PLACE PHILIPSBURG

Mercredi/Wednesday 28/11/2012
 • 9H-13H DISPENSAIRE / HEALTH CENTER CONCORDIA

GRATUIT - RAPIDE - FIABLE

Jeudi/Thursday 29/11/2012
 • 9H-18H HOPITAL L.C.FLEMING
 • 1 TEST VIH - IT-SHIRT COLLECTOR "I NEED TO KNOW"
 • 9H-18H AIDES ASSOCIATION : TOP OF US IMPORT CONCORDIA
 • INFORMATION & CONDOMS

Samedi/Saturday 01/12/2012
 WATERFRONT MARIGOT
 • 6H WALK TO FIGHT AIDS WITH "HOT & SPICY"
 • 8H-17H DEPISTAGE VIH / HIV TESTING
 • 12H FLASH MOB - ZUMBA - THEATRE..
 • ANIMATION & GIFTS ...

1^{er} DECEMBRE 2012
JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA







+ Partenariats



Réalisation des tests

- **Test rapide sur sang total**

(DETERMINE HIV-1/2 Ag/Ab Combo[®])

- **Réalisé par du personnel formé**

- **Après counseling et consentement éclairé de l'utilisateur**

- **Si dernier risque \geq à 6 semaines**

- **Confirmation par ELISA de tout TROD positif**

- **Depuis 2010, la totalité du dépistage**

est réalisé par l'infirmière

Rôle de l'infirmière (1)

👉 ENTRETIEN PRÉ / PER -TEST

- Consentement éclairé
- Différents résultats possibles
- Délai \geq 6 semaines ou 3 mois du dernier risque en fonction du test
- Nécessité de confirmer 1 TROD positif par 1 test ELISA
- Entretien dans la langue du patient


EXEMPLES DE QUESTIONS

- *Qu'est-ce qui vous amène à faire 1 test aujourd'hui?*
- *Quels sont les modes de transmission, de prévention que vous connaissez?*
- *Selon vous, quels sont vos facteurs de risques (pratiques sexuelles, alcool, drogues...)*
- *Quelles seraient vos réactions si ce test est positif?*

.....

Rôle de l'infirmière (2)

a) Prélèvement



b) Réalisation du test

Determine HIV-1/2 Ag/Ab Combo Whole Blood Procedure

(Refer to package inserts for assay procedures)




1 Remove tests



2 Remove cover




3 Add sample



Add sample (150µl) to sample pad (finger stick or venipuncture)



Note: Removal of the test units should start from the right side of the test card to preserve the lot number which appears on the left side of the card.

4 Add chase buffer



Add one drop of chase buffer

5 Read results



Rôle de l'infirmière (3)

ENTRETIEN POST-TEST

- Explication du résultat, s'assurer que la personne a bien compris
- Écoute ++++
- Messages de prévention
- Test de confirmation si TROD positif
- Orientation adaptée (Médecin, Assistante Sociale, Associations...)

EXEMPLES DE QUESTIONS

- *Comment vous sentez-vous avec ce résultat?*
 - *Vos comportements vont-t-ils changer avec ce résultat?*
 - *Avec qui avez-vous envie de partager ce résultat?*
 - *Si résultat positif: De quoi avez-vous besoin dans l'immédiat?*
- + *Fixer rendez-vous pour le résultat de confirmation*

.....

APERÇU DES RESULTATS (1)

Du 01/01/2008 au 31/12/2014

4290 TRODs

73% femmes

27% hommes

Âge 30 ans (13-80)

Pays d'origine: France/DFA 41%, Haïti 22%, Rép. Dominicaine 12%...

APERÇU DES RESULTATS (2)

Total	Non valides	Positifs	Faux Positifs	Non remis
4290	14	55	4	10
	0,33%	1,28 %	0,09%	0,23%



99,77% rendus


**JUSTE UN
DOIGT
POUR SE
FAIRE
DEPISTER**



**CAPOTES
+ DEPISTAGES
+ TRAITEMENTS
= PREVENTION**



AUJOURD'HUI



DEMAIN

COMMENT ÇA MARCHE


- 1 Désinfecter le bout du doigt et piquer.
- 2 Prélever la goutte de sang avec le finis et le placer sur le support (qui contient un liquide réactif aux anticorps produits en cas d'infection par le VIH).
- 3 Résultat après quinze minutes d'attente : une bande si c'est négatif, deux bandes si c'est positif.
- 4 En cas de résultat positif, contacter sans attendre son médecin ou le centre anonyme et gratuit de Sida Info Service au 0.800.040.000.

Contient de la poudre, mettre dans un récipient propre, conserver au sec et à l'abri de la lumière.

Un dispositif à usage unique pour la prise d'une goutte de sang.

4. * Il faut se faire vacciner contre l'hépatite B, la typhoïde, la rage et la VSR.
 * Tout résultat positif doit être confirmé par un test de sang en laboratoire.

110mg/10ml



CONCLUSION (1) POUR LE PERSONNEL

- Facilité et simplicité d'utilisation
 - réalisable en toute circonstance
- Valorisation du travail de l'IDE
 - responsable de la réalisation du test
 - création de documents, rédaction de procédures...
- Organisation basée sur l'activité IDE
 - Temps IDE supplémentaire
 - Acceptation par le corps médical...
- La formation est un élément essentiel de la réussite d'un tel projet
 - formation initiale puis continue des intervenants
 - formation "par les pairs" dans d'autres services (Maternité, Urgences)

CONCLUSION (2) POUR LES USAGERS

- Le taux de remise des résultats des TRODs est très élevé
 - favorise la connaissance de leur statut sérologique par les usagers (*avec réserve sur la fenêtre sérologique*)
- Développement d'actions 'hors les murs' avec les partenaires
 - atteindre les populations éloignées des structures de soin (*conseils de quartiers, églises, Chrétiens et Sida, AIDES...*)
- Ne pas négliger la "crainte" d'un résultat trop rapide par l'utilisateur
- Le risque de renoncement aux résultats des autres tests de dépistage est à prendre ++ en considération (*Syphilis, hépatites, Chlamydiae...*)
 - inclure cette donnée dans le counseling
 - adapter les pratiques (recueil du numéro de téléphone...)

REMERCIEMENTS



- Aux Drs F. BISSUEL et A. CABIÉ qui ont été les précurseurs de cette nouvelle technique à St-Martin et en Martinique

- À l'équipe du C.H. L.C. Fleming

- Et à toutes les personnes qui m'ont permis d'être présente avec vous

MERCI DE VOTRE ATTENTION

