




## **EXPERIENCE DES TRODs AU CIDDIST de SAINT-MARTIN**

**Nadia AGAPE (IDE responsable)**

**CENTE HOSPITALIER LOUIS-CONSTANT FLEMING  
SAINT-MARTIN (ANTILLES FRANCAISES)**


Formation TRODs COREVIH Arc Alpin  
Annecy, Mai 2015



# SAINT-MARTIN?.....

Une île, Deux pays

- 90 000 habitants
- 2 systèmes de prise en charge différents
- Plus de 100 nationalités
- Langues: Anglais, français, espagnol, créole, néerlandais



## Pourquoi les TRODs dès 2007 ?

- Forte prévalence du VIH à St-Martin (1%)
- Dépistage plus tardif dans les DFA qu'en métropole  
[Bouillon, VESPA, 2003]
- Renforcement du dépistage dans les DFA en direction  
des personnes les plus vulnérables [Nacher, AIDS, 2005]
- Orienter l'activité des CDAG vers les populations en  
situation de difficultés d'accès aux soins [CNS, 2006]
- Expérience Nord-américaine des tests rapides



ScienceDirect  
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France  
EM|consulte  
www.em-consulte.com

Médecine et  
maladies infectieuses

Médecine et maladies infectieuses 39 (2009) 370–374

Article original

## Tests de dépistage rapides du VIH dans des consultations de dépistage anonyme et gratuit aux Antilles

*Use of HIV rapid tests in free and anonymous screening consultations in the French West Indies*

A. Cabié<sup>a</sup>, F. Bissuel<sup>b,\*</sup>, S. Abel<sup>a</sup>, P. Huc<sup>b</sup>, L. Paturel<sup>a</sup>, S. Pierre-François<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Service des maladies infectieuses et tropicales, centre hospitalier universitaire, BP 362, 97261 Fort-de-France cedex, France

<sup>b</sup> Unité de dépistage et soins des maladies transmissibles, centre hospitalier Louis-Constant-Fleming, BP 381, 97054 Saint-Martin cedex, France

Reçu le 29 novembre 2008 ; accepté le 26 février 2009

Disponible sur Internet le 5 avril 2009

### ■ Faisabilité

- Le TROD est facilement réalisable en CDAG/CIDDIST
- Nécessite un Personnel formé: technique, performances du test, counseling

### ■ Acceptabilité

- Perception positive par les usagers

### ■ Amélioration du taux de remise des résultats des tests VIH

➤ En 2008, la pratique des TRODs est adoptée au CIDDIST

# Création de documents adaptés

  
**CIDDIST**  
**TEST DE DÉPISTAGE RAPIDE DU VIH**  
**RESULTAT POUR ARCHIVAGE**

🕒 Heure de réalisation du test : .....h.....

**RISQUE :**  ≤ 3 mois  > 3 mois

🕒 Heure de lecture du test : .....h.....

POSITIF

NÉGATIF

NON VALIDE

Commentaire : .....

Tampon et signature du Médecin :

**COLLER ICI LE TEST DETERMINE HIV 1/2**

  
**CIDDIST**  
**TEST DE DÉPISTAGE RAPIDE DU VIH**  
**RESULTAT POUR ARCHIVAGE**

🕒 Heure de réalisation du test : .....h.....

**RISQUE :**  ≤ 3 mois  > 3 mois

🕒 Heure de lecture du test : .....h.....

POSITIF

NÉGATIF

NON VALIDE

Commentaire : .....

Tampon et signature du Médecin :

**COLLER ICI LE TEST DETERMINE HIV 1/2**



**CIDISTACIDAD du C.H. Louis-Constant FLEMING**  
ANCIENNE DESCHAMPELLE DESCHAMPELLE

### TEST DE DEPISTAGE RAPIDE DU VIH (HIV RAPID TEST)

Tous droits réservés. DETERMINE HIV 1+2 sur sang total par digi-panduiton  
test rapide et automatisé. Résultats en 15 minutes. Ce test est destiné à détecter le VIH 1+2.

TEST REALISE LE : **MARDI 1ER DECEMBRE 2009**

Numéro d'Anonymat

carne /	numéro d'ordre /	date de naissance : JJ / MM / AA :
---------	------------------	------------------------------------

RÉSULTAT

**VIH - NÉGATIF**  
(HIV-NEGATIVE / VIH-NEGATIVO)

**Commentaire:**

- Ce résultat négatif signifie qu'il n'y a pas de trace d'une infection à VIH dans votre sang. Mais si vous avez eu un risque de transmission du VIH moins de 3 mois avant de réaliser ce test, ce résultat devra être confirmé par un autre test. Le médecin vous expliquera quand et comment effectuer ce contrôle.
- The test is negative: there is no evidence of HIV infection in your blood. But the test may not show recent infection. If you experienced any situation at risk of HIV infection less than 3 months before this test, a second test will be necessary to confirm this result. This physician will explain to you when and how to make this control.
- Este resultado negativo significa que no se ha encontrado ningún signo de infección VIH en su sangre. Pero si usted ha estado expuesto a un riesgo de transmisión del VIH menos de 3 meses antes de realizar esta prueba, este mismo resultado tendrá que ser confirmado por otra prueba. El médico le explicará cuando y como realizar este chequeo.
- Résultat négatif: Pas de trace de VIH dans votre sang. Mais si on vous a exposé à un risque de transmission du VIH moins de 3 mois avant de réaliser ce test, ce résultat devra être confirmé par un autre test. Le médecin vous expliquera quand et comment effectuer ce contrôle.

Tambien el resultado de Médico

**DR FRANCIS BISSUEL**  
CENTRE HOSPITALIER  
MEDICINE - GISTH  
BP 301 - 97054  
SAINT-MARTIN CEDEX

Hôpital MARIGOT 1 RUE DE LA 2E 74  
Lundi-Mardi, 7h - Samedi, 18h-20h - 24h-24h  
Mardi-Mardi 24h-24h - Mercredi, 7h-20h - 24h-24h  
Jeudi, Vendredi, 7h - Samedi, 7h-20h - 24h-24h  
Samedi 7h-20h - 24h-24h - Dimanche, 7h-20h  
Dimanche : SANDY GROUND 105948158.92  
MARTI Tuesday 105948158.92 - 24h-24h



International Journal of STD & AIDS 2011; 22: 757–758

# Impact of rapid HIV testing on the return rate for routine test results in sexually transmitted infection testing centres

**A Cabié** MD<sup>\*†</sup>, **F Bissuel** MD<sup>‡</sup>, **P Huc** MD<sup>§</sup>, **L Paturel** MD<sup>\*\*</sup> and **S Abel** MD<sup>\*</sup>

<sup>\*</sup>Infectious and Tropical Diseases Department, CHU de Fort-de-France, Martinique; <sup>†</sup>CIC-EC Antilles Guyane, Inserm CIE802 and E4 4537 Université des Antilles et de la Guyane; <sup>‡</sup>Transmissible Diseases Unit; <sup>§</sup>Biology Laboratory, L.C. Fleming Hospital, Saint-Martin, Guadeloupe; <sup>\*\*</sup>Department of Virology, CHU de Fort-de-France, Martinique, France.

**Summary:** To strengthen HIV screening in the French West Indies (FWI), we evaluated the feasibility of rapid tests in sexually transmitted infection (STI) testing centres. Rapid testing was offered to each user ahead of the standard screening tests. Between October 2007 and December 2008, 847 users had HIV rapid testing, and 1724 users did not have rapid testing. The results of rapid testing were returned to 99.1% of testers. However, clients who underwent rapid testing were significantly more likely than others to have not returned to get the results of their standard screening tests (for HIV and other STIs): 27.4% versus 14.0% with a relative risk of 1.96 (95% confidence interval [CI] 1.67–2.30,  $P < 0.0001$ ). Rapid HIV testing has the capacity to reduce the return rates for confirmatory results of HIV testing and other STIs.

## Conclusions

- Le taux de renoncement aux résultats des tests classiques (VIH/IST) est plus élevé chez les personnes ayant réalisé un TROD VIH (27.4% vs 14.0%)

## Conséquences au CIDDIST de Saint-Martin

- **Modification de l'organisation du centre**
- **Formation des équipes**
- **Evolution du travail des infirmières:**
  - **Responsabilité**
    - Réalisation des TROD
    - Counseling per-test
    - Remise du résultat du TROD
  - **Une double perception**
    - **Positive**
      - Satisfaction professionnelle: nouvelle technique, faire évoluer la prévention, aller jusqu'au bout de la démarche
      - Satisfaction des usagers: rapidité, répond à son attente
    - **Négative**
      - Charge de travail
      - Stress supplémentaire
      - Fatigue

Dans le cadre des TRODs,  
le médecin est sollicité pour:

- ✓ TROD positif
- ✓ AEV  $\leq$  72h
- ✓ Toute interrogation de l'IDE

# Organisation du CIDDSIT

## Equipe:

### -Médecins:

- Dr C. CLAVEL, Dr J. RELTIEN, Dr S. STEGMANN-  
PLANCHARD

### -Infirmières :

-D. JOSEPH, N. AGAPE, B. LEDOUX et M. MESSEGER  
(*mutualisation avec UDSMT, CLAT, Vaccination*)

-Secrétaire, Psychologue, Assistante sociale

# Centre principal



# Antennes

