



Guadeloupe
St-Martin • St-Barth.
coordination régionale
de lutte contre le VIH

Pourquoi intensifier le dépistage?

Gpe 1ère 27 novembre 2012


Améliorer le dépistage

- Dépistage trop tardif en Guadeloupe
- Entraînant
 - Perte de chance pour les patients
 - Persistance de l'épidémie

2 fois plus de dépistages en Guadeloupe




Une activité de dépistage plus importante
dans les COREVIH d'Outre-Mer, Ile-de-France et PACA



France :
77 sérologies VIH
réalisées en 2010
/ 1000 hab.

Corevih IdF Ouest = 80 /1000
Corevih IdF Est = 93 /1000
Corevih IdF Nord = 104 /1000
Corevih IdF Sud = 125 /1000
Corevih IdF Centre = 187 /1000

Nombre de sérologies VIH réalisées, selon la localisation du laboratoire, /1000 habitants :




Sources : InVS, LaboVIH 2010, mise à jour septembre 2011

Insee, population légale au 01/01/2008 par commune, département et région, mise à jour mars 2011

5 fois plus de dépistés/ Millions d'habitants



Découvertes de séropositivité VIH en 2010 :
les COREVIH Guadeloupe, Ile-de-France Centre et Guyane ont diagnostiqué 5 à 12 fois plus de cas que la moyenne nationale



France :
97 découvertes VIH+
/ million d'hab.
en 2010

Corevih IdF Ouest = 113 /M
Corevih IdF Est = 228 /M
Corevih IdF Nord = 245 /M
Corevih IdF Sud = 234 /M
Corevih IdF Centre = 954 /M

Nombre de découvertes, selon la localisation du déclarant, par millions d'habitants



Sources : InVS, déclaration obligatoire du VIH, données au 31/12/2010, corrigées pour les délais de déclaration et la sous déclaration Insee, population légale au 01/01/2008 par commune, département et région, mise à jour mars 2011

Les personnes nouvellement dépistées entre le 1^{er} janvier 2012 et le 30 septembre 2012

- Parmi ces 80 nouveaux dépistés
 - 67% Sont dépistés après 5 ans d'évolution de leur maladie
 - 43% après 8 à 10 ans d'évolution de leur maladie
- Près de 75% n'ont pas de signe de maladie en dehors de quelques primo infections

Les méfaits du virus dans le temps

- Le virus dès qu'il est dans l'organisme se multiplie des milliards de fois
- Il entraîne par la suite une inflammation chronique responsable du vieillissement prématuré des tissus dont le cerveau
- Une fréquence plus importante de cancers
- Et plus tardivement une apparition de maladies dues à la baisse de l'immunité

Les traitements actuels sont très efficaces

- Ils empêchent le virus de se multiplier et réduisent considérablement sa quantité dans l'organisme
- Ils permettent à l'immunité de s'améliorer et donc empêchent l'évolution vers le SIDA
- Si donner tôt, ils permettent de vivre aussi longtemps que les autres personnes du même âge
- Ils réduisent la transmission sexuelle et la transmission de la mère séropositive enceinte à son enfant.

Intérêt du traitement pour lutter contre épidémie

- Traitement efficace réduit considérablement la charge virale d'une personne qui vit avec le VIH et de 95% la transmission à un partenaire séronégatif
- Plus on dépiste et traite, plus on réduit la charge virale communautaire
- Plus on pourra renverser le cours de l'épidémie

Charge virale communautaire



Avant dépistage de tous patients séropositifs




Après dépistage et traitement


Nouvelles stratégies de dépistage

- Proposer systématiquement le test en milieu de soin aux plus de 15 ans même en dehors de toute notion de risque.
- Répéter le test tous les ans si plus d'un partenaire
- Dépister la primo infection
- Favoriser le dépistage de proximité
 - TROD test rapide d'orientation diagnostic.
 - Associations, Centres de dépistage, médecine libérale (étude en cours)

Dépister même sans signe



Dépister la primo-infection



Primo infection

Signes d'une grosse grippe ou grosse dengue 10 à 15 jours après contamination.

Mais 1 fois sur deux pas de signe

- Si prise de risque; consulter rapidement, pour éventuel traitement de 28 jours qui sera d'autant plus efficace pour éviter la contamination qu'il sera pris tôt, sinon se protéger et faire test 6 semaines après avec test classique.

Merci de votre attention
et bon dépistage





Guadeloupe
St-Martin • St-Barth.
coordination régionale
de lutte contre le VIH

Nouvelles approches de prévention

Gpe 1^{ère} 27 novembre 2012

Outils de prévention

méthodes axées sur changement de comportement

- Abstinence? peu suivie
- 1980 réduction du nombre des partenaires
- Report du premier rapport (éducation sexuelle)
- Promotion du préservatif masculin et féminin
réduit de 90 à 95% risques de transmission par rapport à l'absence de protection
- Gestion du risque:
 - Du plus au moins important: Anal, vaginal, orogénital, facteurs aggravant, substances psychoactives
 - Mais un risque faible répété engendre des transmissions
- Connaissance du statut sérologique du partenaire

Outils de prévention

méthodes bio médicales

Le dépistage

Connaître son statut sérologique augmente de 2 à 3 fois la probabilité de se protéger si on est séropositif

Traitement antirétroviral

Traitement post exposition (prise en charge de accidents d'exposition)

Traitement des personnes porteuses du virus

Traitement pré exposition (A l'étude)

Méthodes de prévention combinée

- Méthode de prévention comportementale
- Nouvelles stratégies de dépistage
- Traitement antirétroviral

Tout est possible si on travaille tous ensemble

- Merci pour votre attention

