

TABAC

Regards croisés VIH et
professionnels de santé



Octobre 2024

FICHE TECHNIQUE



ÉCHANTILLON



PvVIH

Échantillon de **239** personnes de 18 ans ou plus vivant avec le **VIH (PvVIH)** parmi eux :

- **126** fumeurs actuels
- **106** qui ont fumé au cours de leur vie



PROFESSIONNELS
DE SANTE

Échantillon de **371*** professionnels de santé, prenant en charge des patients atteints du VIH (mode d'exercice mixte ou hospitaliers), dont :

- **111** infectiologues
- **106** médecins généralistes
- **98** pharmaciens
- **33** infirmiers en ETP / infirmiers hospitaliers en service infectieux
- **5** addictologues
- **3** tabacologues
- **25** autres professionnels de santé

* Total supérieur à la somme car plusieurs réponses possibles



DATES DE TERRAIN

Du **3 juillet** au **11 octobre**
2024

Du **4 juillet** au **4 octobre**
2024



MÉTHODOLOGIE

Echantillon interrogé par Internet via le relai de l'association Actions Traitements auprès de partenaires associatifs et des COREVIH

Echantillon interrogé par Internet:

- via notre partenaire spécialisé (panel de professionnels de santé)
- via le relai de l'association Actions Traitements auprès des professionnels de santé et des COREVIH



Ce rapport a été élaboré dans le respect de la norme internationale ISO 20252 « Etudes de marché, études sociales et d'opinion ». Ce rapport a été relu par Etienne Mercier, Directeur du département Opinion & Santé, Public Affairs France.



Tout au long du questionnaire, la notion de consommation de tabac intègre la cigarette, mais aussi la chicha, le narguilé, le cannabis, etc. En revanche, cela exclut la cigarette électronique.

QUI SONT LES RÉPONDANTS ?


0

PROFIL DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

0a



Le profil des PvVIH interrogées




▶ **90%** des PvVIH interrogées sont **nées en France**, tandis que 8% sont nées dans un autre pays.

▶ **98%** ont rempli le questionnaire **seul**, 2% l'ont fait avec une aide extérieure (un proche ou un professionnel de santé)




Le profil des PvVIH interrogées


RS12. Depuis combien de temps êtes-vous séropositif ?



RS14. Comment définiriez-vous votre sexualité ?




Le profil tabagique des personnes vivant avec le VIH interrogées



PvVIH
fumeurs actuels

54%

fument actuellement, ne serait-ce que de temps en temps ou même de manière très occasionnelle




PvVIH
anciens fumeurs

46%

ont fumé dans le passé, ne serait-ce que de temps en temps ou même de manière très occasionnelle

La consommation de tabac et de cannabis des personnes vivant avec le VIH : une prédominance des cigarettes en paquet.



Pas de différences significatives observées entre les fumeurs actuels et les anciens fumeurs.

Q6. Fumez-vous ? / Fumiez-vous ?
Base : ensemble des PvVIH (n = 232)




L'âge du début de la consommation de tabac des PvVIH : 18 ans en moyenne



PvVIH


Âge à partir duquel les PvVIH ont commencé à fumer



PvVIH fumeurs actuels

Nombre d'années depuis lesquelles les PvVIH fumeurs actuels fument

TEMPS MOYEN DEPUIS LEQUEL ILS FUMENT : **32,2 ANNÉES**
1% ne sait plus



Q9. A quel âge avez-vous commencé à fumer ?
Base : ensemble des PvVIH (n = 232)

Le profil des PvVIH anciens fumeurs



Temps écoulé depuis l'arrêt du tabagisme



TEMPS MOYEN DEPUIS LEQUEL
LES PVVIH INTERROGÉES ONT
ARRÊTÉ DE FUMER :
10 ANNÉES

3% ne savent plus

Nombre d'années pendant lesquelles les PvVIH ont fumé



TEMPS MOYEN PENDANT
LEQUEL ILS ONT FUMÉ:
28,7 ANNÉES


4% ne savent plus

Q23. Depuis combien de temps avez-vous complètement arrêté de fumer ?
Base : PvVIH qui ont fumé par le passé (n = 106)

LA PERCEPTION DES RISQUES LIÉS AU TABAC CHEZ LES PVVIH

1

Massivement les PvVIH sont conscientes des impacts négatifs du tabac sur leur santé, notamment concernant leurs poumons, leur espérance de vie, leur santé cardiovasculaire et leur peau.




Q11. Diriez-vous que le tabac a / a eu des conséquences négatives importantes sur ... ?

Base : ensemble des PvVIH (n = 232)



Alors que les PvVIH sont plutôt informées sur l'impact du tabac sur l'espérance de vie et sur les risques cardiovasculaires associés, les connaissances sont nettement plus faibles sur les autres aspects. Les professionnels de santé se distinguent par de meilleures connaissances, même si des lacunes persistent.



Q4 / Q1. Pour chacune des affirmations suivantes diriez-vous qu'elle est VRAIE ou FAUSSE ? Si vous ne savez pas vraiment, répondez ne sait pas.

Base : ensemble des PvVIH (n = 232) et des professionnels de santé (n = 371)


LE TABAC DANS LE QUOTIDIEN DES PVVIH : QUALITÉ DE VIE ET MOTIVATIONS À FUMER

2

L'IMPACT DE L'ARRÊT DU TABAC SUR LA SANTÉ DES PVVIH

2a


Les anciens fumeurs sont unanimes : avec l'arrêt du tabac, les symptômes respiratoires tels que la toux et l'essoufflement ont fortement diminué, tandis que leurs performances physiques se sont améliorées et qu'ils ont retrouvé le goût et l'odorat.



Pas de différences significatives observées selon le temps écoulé depuis l'arrêt du tabac.

Q12. Depuis que vous avez arrêté de fumer, avez-vous observé les changements suivants ?
Base : PvVIH qui ont fumé par le passé (n = 106)

Les conséquences de l'arrêt du tabac sont moins visibles aux yeux des anciens fumeurs sur leur niveau de stress ou d'anxiété, ainsi que sur leur irritabilité.



Pas de différences significatives observées selon le temps écoulé depuis l'arrêt du tabac.

Q12. Depuis que vous avez arrêté de fumer, avez-vous observé les changements suivants ?
Base : PvVIH qui ont fumé par le passé (n = 106)

LE PROFIL TABAGIQUE DES PVVIH - 2b

LE TEST QCT2 DE GILLIARD

EXPLICATION DU TEST QCT2 DE GILLIARD



Le **test QCT2 de Gilliard**, diffusé par Tabac Info Service, est un questionnaire qui permet de définir **4 profils de fumeurs** en se basant sur leurs comportements tabagiques, qui illustrent le lien avec le tabac.

Le test est composé de plusieurs items regroupés en quatre catégories principales. Chaque catégorie évalue un aspect spécifique du comportement du fumeur, à travers 7 items de questions :

Dépendance = Cette catégorie mesure le **niveau de dépendance** du fumeur à la **nicotine**.

Dimension Sociale = Cette dimension évalue **l'influence sociale** et l'interaction sociale liées à l'acte de fumer.

Régulation des Affects Négatifs = Cette section examine comment le fumeur utilise le tabac **pour gérer ses émotions négatives**.

Hédonisme/Geste = Cette catégorie évalue **le plaisir** et les gestes associés à l'acte de fumer.

Mode de Calcul :

Pour chaque catégorie (D, S, A, H), faites la somme des scores obtenus aux items correspondants. Chaque catégorie a un total possible de 21 points (7 items, chaque item pouvant rapporter jusqu'à 3 points).

Les réponses aux items sont notées sur une échelle de 0 à 3 :

Tout à fait : 3 points

Plutôt oui : 2 points

Plutôt non : 1 point

Pas du tout : 0 point

Les fumeurs interrogés, qu'ils fument actuellement ou aient arrêté, se caractérisent par une forte dépendance à la nicotine, l'utilisation du tabac pour réguler leurs affects négatifs et un plaisir associé au fait de fumer. La dimension sociale du tabac semble moins marquée.



PvVIH fumeurs actuels

Score de 0 à 21



Dépendance



Dimension sociale



Régulation des affects négatifs



Hédonisme / geste



PvVIH anciens fumeurs

Score de 0 à 21




Dépendance



Dimension sociale



Régulation des affects négatifs



Hédonisme / geste



Q13. Pour chacune des affirmations suivantes diriez-vous qu'elle vous correspond ou non ?
Base : ensemble des PvVIH (n = 232)

Plus d'un tiers des fumeurs actuels se caractérisent par une forte dépendance à la nicotine, une proportion encore plus haute au sein des anciens fumeurs.




DÉPENDANCE



PvVIH fumeurs actuels



PvVIH anciens fumeurs



Q13. Pour chacune des affirmations suivantes diriez-vous qu'elle vous correspond ou non ?

Base : ensemble des PvVIH (n = 232)

Dans le détail, les signes de dépendance les plus fréquemment observés sont les suivants : fumer par habitude, dans les moments d'attente, et un manque lorsqu'ils n'ont pas pu fumer depuis un certain temps.




PvVIH anciens fumeurs

DÉPENDANCE



PvVIH fumeurs actuels




Q13. Pour chacune des affirmations suivantes diriez-vous qu'elle vous correspond ou non ?
Base : ensemble des PvVIH (n = 232)

Alors que la dimension sociale semble être un trait qui caractérise plus faiblement les fumeurs actuels, les anciens fumeurs ont une vision très différente, qui peut apparaître comme le signe d'une prise de conscience a posteriori de l'aspect social du tabac.



DIMENSION SOCIALE



Q13. Pour chacune des affirmations suivantes diriez-vous qu'elle vous correspond ou non ?
Base : ensemble des PvVIH (n = 232)


Fumer pour réguler les émotions négatives, un comportement face au tabac fréquemment adopté par plus d'un tiers des fumeurs actuels et 41% des anciens fumeurs.




RÉGULATION DES AFFECTS NÉGATIFS



PvVIH fumeurs actuels



PvVIH anciens fumeurs



Q13. Pour chacune des affirmations suivantes diriez-vous qu'elle vous correspond ou non ?
Base : ensemble des PvVIH (n = 232)

Le plaisir et le geste associé à l'acte de fumer représente une dimension importante de la relation au tabac des fumeurs : cela définit fortement 3 fumeurs actuels sur 10.



HÉDONISME / GESTE



PvVIH fumeurs actuels



PvVIH anciens fumeurs



Q13. Pour chacune des affirmations suivantes diriez-vous qu'elle vous correspond ou non ?



Base : ensemble des PvVIH (n = 232)



1 fumeur actuel sur 5 déclarent fumer pour oublier le VIH et leurs traitements.



Je fume pour oublier le VIH et ses traitements



Q13. Pour chacune des affirmations suivantes diriez-vous qu'elle vous correspond ou non ?
Base : ensemble des PvVIH (n = 232)


LES POLY-CONSOMMATIONS ET AUTRES ADDICTIONS DES PVVIH

2c

Les PvVIH sont nombreux à consommer des substances nocives, tel que l'alcool, des drogues comme l'ecstasy ou à avoir des relations sexuelles sous l'emprise de drogues.



78% consomment actuellement une de ces substances



OUI, VOUS LE FAITES **NON, VOUS NE LE FAITES PLUS AUJOURD'HUI, MAIS L'AVEZ FAIT PAR LE PASSÉ** **NON, VOUS NE L'AVEZ JAMAIS FAIT** **VOUS NE SOUHAITEZ PAS RÉPONDRE**

Q34. Actuellement, vous arrive-t-il de faire les choses suivantes ?
 Base : ensemble des PvVIH (n = 232)



L'ARRÊT DU TABAC (INTENTION, MOTIVATION, FREIN)

3

Les fumeurs actuels sont nombreux à avoir déjà arrêté de fumer pendant au moins une semaine ou à envisager sérieusement d'arrêter de fumer.



PvVIH
fumeurs actuels

% OUI



ont déjà arrêté de fumer (de leur propre initiative) au moins une semaine



envisagent sérieusement d'arrêter de fumer



ont déjà consulté des professionnels pour les accompagner dans l'arrêt du tabac



ont déjà essayé de tenir le défi « du mois sans tabac » qui se déroule chaque année en novembre

Q14. Pour toutes les situations suivantes, quelles sont celles qui vous concernent ou qui vous ont concerné ?
Base : PvVIH qui fument actuellement (n = 126)

LES TENTATIVES D'ARRÊT DU TABAC : MESURES MISES EN PLACE PAR LES PVVIH

3a

Parmi ceux qui ont déjà essayé d'arrêter de fumer, ils ont fait plus de 5 tentatives en moyenne. Pour près de 2 sur 5, ils ont déjà réussi à arrêter de fumer pendant plus de 6 mois.




PvVIH
fumeurs actuels




des PvVIH fumeurs actuels ont déjà arrêté de fumer (de leur propre initiative) au moins une semaine

Précision affichée aux répondants : « Par tentative, il faut comprendre le nombre de fois où vous avez réussi à arrêter de fumer pendant au moins 1 semaine ».



12% ne savent pas



2
SEMAINES

2 A 4
SEMAINES


ENTRE 1
ET 6 MOIS

PLUS DE
6 MOIS


Q15. Combien de fois avez-vous déjà essayé d'arrêter de fumer pendant au moins une semaine ?
Base : PvVIH qui fument actuellement et qui ont déjà arrêté de fumer pendant au moins une semaine (n = 111)

Q16. Quelle est la durée maximum pendant laquelle vous êtes parvenu à arrêter de fumer ?
Base : PvVIH qui fument actuellement et qui ont déjà arrêté de fumer pendant au moins une semaine (n = 111)

Du côté des anciens fumeurs, seulement un tiers arrive à arrêter complètement de fumer lors de sa première tentative. Cela fait en moyenne 10 ans qu'ils ont arrêté de fumer.



En moyenne **5,1 FOIS**



En moyenne
10 ANS

MOINS DE 6 MOIS ENTRE 6 MOIS ET 1 AN ENTRE 2 ET 5 ANS ENTRE 6 ET 10 ANS PLUS DE 10 ANS NE SAIT PLUS

Précision affichée aux répondants : « Par tentative, il faut comprendre le nombre de fois où vous avez réussi à arrêter de fumer pendant au moins 1 semaine ».

Q24. Au bout de combien de tentatives êtes-vous parvenu à arrêter de fumer ?
Base : PvVIH qui ont fumé par le passé (n = 106)

Q23. Depuis combien de temps avez-vous complètement arrêté de fumer ?
Base : PvVIH qui ont fumé par le passé (n = 106)



Lorsqu'ils veulent arrêter de fumer, le premier réflexe des fumeurs est de se tourner vers un professionnel de santé qui les suit déjà.



PvVIH

CONSEILS / ENCADREMENT

% OUI

Vous en avez parlé aux professionnels de santé qui vous suivent (généraliste, spécialiste)	66	37
Vous avez cherché des conseils sur internet (Tabac Info Service par exemple)	44	20
Vous avez pris des conseils auprès de vos proches	32	12
Vous avez demandé des conseils à un pharmacien	28	16
Vous avez consulté un spécialiste (tabacologue, addictologue)	27	20
Vous avez eu recours à des médecines alternatives (hypnose, méditation, acupuncture, laser, etc.)	27	20
Vous vous êtes rapproché d'une association	5	5
Vous avez rejoint un groupe de soutien	4	2



PvVIH fumeurs actuels

66

44

32

28

27

27

5

4



PvVIH anciens fumeurs

37

20

12

16

20

20

5

2


Q17 / Q26. Lorsque vous avez cherché à arrêter de fumer avez-vous fait les choses suivantes ?

Base : PvVIH qui fument actuellement et qui ont déjà arrêté de fumer pendant au moins une semaine (n = 111) / PvVIH qui ont fumé par le passé (n = 106)

Les professionnels de santé proposent avant tout à leurs patients qui viennent les voir pour arrêter de fumer d'en parler avec d'autres médecins ou d'avoir recours à des médecines alternatives.

CONSEILS / ENCADREMENT

% OUI



Q17 / Q26. Lorsque vous avez cherché à arrêter de fumer avez-vous fait les choses suivantes ?

Base : PvVIH qui fument actuellement et qui ont déjà arrêté de fumer pendant au moins une semaine et PvVIH qui ont fumé par le passé (n = 217)

Q18. Et faites-vous les choses suivantes face aux PvVIH qui viennent vous voir pour arrêter de fumer ? Base : ensemble des professionnels de santé (n = 371)

En termes d'aide à l'arrêt du tabac, les fumeurs se tournent en majorité vers des substituts comme les patchs ou utilisent des cigarettes électroniques.



RECOURS À DES SUBSTITUTS OU MÉDICAMENTS

% OUI


Vous avez eu recours à des substituts (patch, gommes ou pastilles, inhalateurs, etc.)
Vous avez utilisé une cigarette électronique
Votre médecin vous a prescrit des médicaments adaptés (CHAMPIX* ZYBAN*)



PvVIH fumeurs actuels



PvVIH anciens fumeurs



Q17 / Q26. Lorsque vous avez cherché à arrêter de fumer avez-vous fait les choses suivantes ?

Base : PvVIH qui fument actuellement et qui ont déjà arrêté de fumer pendant au moins une semaine (n = 111) / PvVIH qui ont fumé par le passé (n = 106)

Les difficultés à résister à la tentation dans des moments conviviaux, avoir un entourage fumeur et un moment mal choisi sont les principales raisons avancées par les fumeurs qui ont déjà tenté d'arrêter de fumer.




PvVIH fumeurs actuels

% Oui



PROFESSIONNELS DE SANTE

% Oui




Q18. Pour chacune des raisons suivantes qui peuvent expliquer pourquoi votre tentative n'a pas abouti à un arrêt complet du tabac ou a conduit à une reprise du tabac, indiquez si elle vous correspond ou non ? Base : PvVIH qui fument actuellement et qui ont déjà arrêté de fumer pendant au moins une semaine (n = 111)

Q20. Selon vous, est-ce que chacune des raisons suivantes peut expliquer pourquoi les tentatives d'arrêt du tabac que font les PvVIH qui fument n'aboutissent pas à un arrêt complet du tabac ? Base : ensemble des professionnels de santé (n = 371)

La formulation des items a été adaptée pour les professionnels de santé.

En revanche, le non-aboutissement de la tentative s'explique beaucoup moins par un manque de soutien de l'entourage, un isolement de celui-ci ou une non-volonté d'arrêter le cannabis.



Q18. Pour chacune des raisons suivantes qui peuvent expliquer pourquoi votre tentative n'a pas abouti à un arrêt complet du tabac ou a conduit à une reprise du tabac, indiquez si elle vous correspond ou non ?

Base : PvVIH qui fument actuellement et qui ont déjà arrêté de fumer pendant au moins une semaine (n = 111)



Q20. Selon vous, est-ce que chacune des raisons suivantes peut expliquer pourquoi les tentatives d'arrêt du tabac que font les PvVIH qui fument n'aboutissent pas à un arrêt complet du tabac ?

Base : ensemble des professionnels de santé (n = 371)

La formulation des items a été adaptée pour les professionnels de santé.




Pour les anciens fumeurs, les moyens les plus efficaces pour arrêter de fumer ont été le recours à des substituts, l'utilisation d'une cigarette électronique et l'implication dans d'autres activités.



Q27. Et parmi tous ces moyens que vous avez activés pour arrêter de fumer, quels sont les deux qui ont été les plus efficaces pour réussir à arrêter de fumer ?

Base : PvVIH qui ont fumé par le passé en activant au moins un moyen (n = 81)

Pour arrêter de fumer, les fumeurs actuels déclarent avoir besoin avant tout d'une activité physique pour se dépenser, d'avoir recours à des médecines alternatives ou d'utiliser des substituts nicotiques.



Q21. Parmi les éléments suivants quels sont les 3 qui pour vous seraient les plus efficaces pour vous aider à arrêter de fumer ?


Base : PvVIH qui fument actuellement (n = 126)

ÊTRE DANS UNE DÉMARCHE D'ARRÊT DU TABAC : MOTIVATIONS ET FREINS **3b**

Près de la moitié des fumeurs qui envisagent d'arrêter de fumer pensent à le faire à moyen terme, d'ici 6 mois.



des PvVIH fumeurs actuels envisagent sérieusement d'arrêter de fumer




Q19. A quelle échéance envisagez-vous d'arrêter de fumer ... ?

Base : PvVIH qui fument actuellement et qui envisagent sérieusement d'arrêter de fumer (n = 100)

Aimer fumer est la principale raison pour laquelle les fumeurs actuels n'envisagent pas d'arrêter de fumer.


21% des PvVIH fumeurs actuels n'envisagent pas d'arrêter de fumer



Q22. Parmi les éléments suivants quels sont les 3 qui vous freinent le plus pour ne pas arrêter de fumer ?

Base : PvVIH qui fument actuellement et qui n'envisagent pas d'arrêter de fumer (n = 26)

Du point de vue des professionnels de santé, les freins à l'arrêt du tabac sont nombreux : les patients ont d'autres problèmes à gérer avant le tabac, fumer est une solution qu'ils ont adoptée pour canaliser leur stress, et cela fait partie intégrante de leur routine.



Q21. Quels sont les principaux freins à l'arrêt du tabac, chicha, narguilé, cannabis que vous voyez parmi les PVVIH fumeuses que vous suivez ?

Base : ensemble des professionnels de santé (n = 371)


QUELLE PLACE POUR LE TABAC DANS LES CONSULTATIONS ?

4

COMMENT LE TABAC EST ÉVOQUÉ PENDANT LES CONSULTATIONS ?

4a

Les pharmaciens, infectiologues et médecins généralistes sont les professionnels de santé consultés les plus fréquemment par les PvVIH. Seulement 14% ont vu un addictologue ou un tabacologue au cours de l'an passé.




OUI, PLUSIEURS FOIS OUI, UNE FOIS NON, PAS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS MAIS L'AVEZ DÉJÀ CONSULTÉ VOUS N'AVEZ JAMAIS CONSULTÉ CE PROFESSIONNEL DE SANTÉ VOUS NE SOUHAITEZ PAS RÉPONDRE

Q29. Au cours des 12 derniers mois avez-vous vu ... ?
Base : ensemble des PvVIH (n = 232)

3 professionnels de santé sur 4 déclarent aborder spontanément la consommation de tabac, une proportion encore plus élevée auprès des infectiologues et des médecins généralistes.



PROFESSIONNELS DE SANTE



VS



PvVIH


65% des PvVIH interrogées affirment que l'infectiologue, le médecin généraliste, l'infirmier ou le pharmacien consulté leur en a parlé spontanément.

Q13. Le plus souvent, qui est à l'origine de la discussion sur la consommation de tabac, chicha, narguilé, cannabis ?

Base : ensemble des professionnels de santé (n = 371)



L'addictologue, le tabacologue, l'infectiologue et le médecin généraliste évoquent le plus le rapport au tabac dans les consultations avec des PvVIH fumeurs. Le sujet n'est que peu mentionné auprès des anciens fumeurs.




Q30. Et lors de votre dernière consultation avec chacun de ces professionnels, avez-vous évoqué ensemble [votre consommation de tabac] / [votre rapport au tabac (arrêt, tentation de reprise, etc.)] ?
 Base : PvVIH qui ont consulté ce professionnel de santé au cours des 12 derniers mois

Et 4/5 des professionnels de santé déclarent être à l'aise pour parler du tabac avec les PvVIH. Seulement 1/3 le sont tout à fait




PROFESSIONNELS
DE SANTE



Q9. Diriez-vous que vous vous sentez à l'aise pour aborder le sujet du tabac, chicha, narguilé, cannabis avec les PvVIH ?

Base : ensemble des professionnels de santé (n = 371)

Pour les professionnels de santé pas à l'aise pour parler du tabac, c'est avant tout en raison du sentiment d'un manque de ressources, et de ne pas savoir comment en parler.



Q10. Pour quelle(s) raison(s) n'êtes-vous pas à l'aise pour parler du tabac, chicha, narguilé, cannabis avec les PvVIH ?


Base : aux professionnels de santé qui ne sont pas à l'aise pour aborder le sujet du tabac, chicha, narguilé, cannabis avec les PvVIH (n = 71)

**QUELLES RESSOURCES POUR LES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ POUR
ACCOMPAGNER LES PVVIH DANS
L'ARRÊT DU TABAC ?
QUEL NIVEAU D'INFORMATION ?**

5


Un niveau de formation à améliorer : les professionnels de santé sont nombreux à se sentir mal formés sur le sujet du tabac chez les PvVIH.

72% déclarent se sentir mal formés sur au moins un aspect lié au tabac chez les PvVIH




Q2. Vous sentez-vous formé ou non sur les sujets suivants ?
Base : ensemble des professionnels de santé (n = 371)

Aux yeux des professionnels de santé, il existe de nombreux axes prioritaires pour améliorer l'accompagnement qu'ils proposent aux PvVIH, avec en tête l'intégration du tabac dans leur parcours de soin, ainsi qu'une plus forte sensibilisation au tabac.



Q27. Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous qu'il s'agit d'une priorité pour améliorer votre accompagnement des PvVIH dans leur arrêt du tabac, chicha, narguilé, cannabis ?
Base : ensemble des professionnels de santé (n = 371)

Les mesures visant à mettre à disposition plus d'informations aux professionnels de santé sont moins perçues comme prioritaires, elles n'en restent pas moins importantes pour les professionnels de santé.



Q27. Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous qu'il s'agit d'une priorité pour améliorer votre accompagnement des PvVIH dans leur arrêt du tabac, chicha, narguilé, cannabis ?
 Base : ensemble des professionnels de santé (n = 371)

MERCI